

KLONAFENAC

DICLOFENAC DIETILAMINA 1,16%

Gel dérmico.

Analgésico, antiinflamatorio de uso tópico

Venta libre

Industria Argentina

K-209/H

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO: Lea detenidamente esta información.

Fórmula: Cada 100 gramos contiene: Diclofenac dietilamina 1,16 g, equivalente a 1 g de Diclofenac sódico.

Excipientes: Imidazolinil urea, Polímero del ácido acrílico (Carbopol 940), Trietanolamina, Alcohol etílico 96%, Agua destilada, c.s.

PRESENTACIONES:

Pomos por 50 y 100 gramos. Envases conteniendo 1 y 20 pomos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

INDICACIONES:

Tratamiento local del dolor y aceleración del proceso de recuperación de la función normal en los casos de inflamación traumática o reumática ocasionada por golpes, contusiones, torceduras y esguinces, dolores musculares, dolor de cuello y espalda, dolor reumático, inflamación de tendones y ligamentos.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Adultos y niños mayores de 12 años: según la extensión del área afectada, aplique frotando suavemente 2 a 4 g, 3 a 4 veces al día. Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis recomendada.

Luego de finalizada la aplicación lavarse las manos con abundante agua.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN DESPUÉS DE 7 DÍAS, CONSULTE A SU MÉDICO.

CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO FRENTE A CUALQUIER DUDA QUE SURGIERE DEL USO DE ESTE MEDICAMENTO.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

REACCIONES SECUNDARIAS:

Ocasionalmente reacciones locales como dermatitis de contacto, prurito (comezón o picazón), enrojecimiento, erupción o ardor. Si éstas se presentan, suspenda su uso y consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia o hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquier otro componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroides.

PRECAUCIONES:

Sólo para uso externo. No ingerir. No aplicar en los ojos, mucosas, ni en la piel irritada o heridas abiertas.

Embarazo y lactancia: Consulte a su médico. No usar en mujeres embarazadas o en período de amamantamiento.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura entre 5 °C y 30 °C, en su estuche original. Evitar la exposición a la luz. Mantener el envase bien cerrado.

De: Impre Quil srl
Para: Gerencia Técnica
Asunto: Muestra para corrección
Fecha: 24-11-2016

SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 4962-6666/2247.

- Hospital de Niños Pedro Elizalde: 4300-2115.

- Hospital Posadas: 4658-7777/4654-6648.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234".

Especialidad Medicinal aprobada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.703

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 11/2007



Elaborado en: Av. Bernardo O'Higgins 4034,
B° San Carlos, Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba.
KLONAL S.R.L.
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955