



ROVESTOR **ROSUVASTATINA 10/20 mg**

- R** **Rovestor** Disminuye la progresion y regresion de la aterosclerosis vascular.
- R** **Rovestor** demostro eficacia en todas las etapas del proceso aterotrombotico.
- R** **Rovestor** reduce y corrige los niveles elevados de colesterol-LDL, colesterol total y triglicéridos e incrementa el colesterol-HDL.

Con Rovestor el efecto terapéutico se obtiene 1 semana después del inicio del tratamiento y el 90% de la respuesta máxima se alcanza a las 2 semanas.

Rosuvastatina es eficaz en pacientes adultos con hipercolesterolemia, con o sin hipertrigliceridemia, y en poblaciones especiales de pacientes tales como diabéticos o pacientes con hipercolesterolemia familiar.

Prevención de Eventos Cardiovasculares (ECV) en pacientes considerados de alto riesgo de sufrir un primer evento cardiovascular, como tratamiento coadyuvante a la corrección de otros factores de riesgo.

Bibliografia

Ridker P, Danielson E, Fonseca F, Genest J, Gotto AJr, Kastelein J, et al. Reduction in C-reactive protein and LDL cholesterol and cardiovascular event rates after initiation of rosuvastatin: a prospective study of the JUPITER trial. Lancet 2009; 373(9670): 1175-82. doi: 10.1016/S0140-6736(09) 60447-5

Rosenson R, Farkouh M, Mefford M, Bittner V, Brown T, Taylor B, et al. Trends in use of high-intensity statin therapy after myocardial infarction, 2011 to 2014. J Am Coll Cardiol . 2017; 69(22): 2696-706. doi: 10.1016/j.jacc.2017.03.585