

[REDACTED]

K.029/M

Industria Argentina

Cada comprimido recubierto contiene:

Cada 100 ml de solución (gotas) contiene:

Cada ampolla contiene:

Cada supositorio para adulto contiene:

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Espasmolítico - Analgésico

INDICACIONES:

Cólicos hepáticos, cólicos renales, todos los estados espasmódicos intensamente dolorosos de los órganos digestivos, vías biliares y urinarias. Estados espasmódicos de los órganos genitales femeninos, dismenorrea, dolores post-operatorios.

POSOLÓGIA:

Comprimidos recubiertos:

1 o 2 comprimidos recubiertos, 3 veces al día. Deberán ser ingeridos enteros.

Gotas:

Adultos: 40 gotas, 3 - 4 veces al día.

Niños en edad escolar: 20 gotas, 3 - 4 veces al día.

Niños pequeños de más de 1 año: 10 gotas, 3 veces al día.

Ampollas:

En estado espasmódico intenso, una ampolla intramuscular profunda o intravenosa lenta (5 min). Nunca subcutánea, ni intraarterial.

Supositorios:

1 supositorio, en caso necesario, puede repetirse esta dosis varias veces al día, con intervalos de 2 a 4 horas.

CONTRAINDICACIONES PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Luar G Compositum está contraindicado en casos de hipersensibilidad a la dipirona u otros derivados de pirazolonas. No debe utilizarse tampoco en pacientes con alteraciones hematológicas y/o que presenten evidencias de depresión medular.

En raras ocasiones puede producir reacciones de hipersensibilidad. La reacción más seria es la reducción o desaparición de glóbulos blancos, por lo tanto si se presenta un deterioro inesperado de la condición del paciente, si aparece o reaparece fiebre y/o dolor de garganta de origen desconocido, suspender inmediatamente el medicamento y consultar al médico.

Shock alérgico es otra reacción grave y rara, sus primeros síntomas son: prurito, sudoración fría, mareos, náuseas, dificultad para respirar; si ellos se presentan, acudir al médico. Hasta que el mismo llegue, asegurarse de que el paciente permanezca acostado, con las piernas levantadas y las vías aéreas despejadas. Usar con precaución especial durante el embarazo y la lactancia, en lactantes, niños, en insuficiencia renal o hepática y en pacientes con historia de úlcera péptica o enfermedades sanguíneas. Como todos los analgésicos-antiinflamatorios inyectables, Luar G

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:/..../....	Fecha:..../..../....	Fecha:..../..../....
		Resolución

Código/Versión	K.029/M
Color de Impresión:	Negro
Medida:	135 x 240 mm
Formato:	12

Compositum debe usarse por esa vía el tiempo mínimo indispensable que determine el médico, y retornar lo más pronto posible a la forma oral. Es recomendable y seguro administrar la forma inyectable en lugares provistos e idóneos para tratar prontamente el shock alérgico grave. No usar la vía parenteral en glaucoma de ángulo estrecho, íleo, retención urinaria, megacolon y taquiarritmias.

GOTAS:

Advertencias:

No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram

Precauciones:

Basado en la presencia de alcohol etílico como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede presentar constipación.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital Nacional Alejandro Posadas:

Centro de toxicología: 011-4658-7777/011-4654-6648

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 0800-444-8694

Centro de toxicología: 011-4962-6666

Hospital General de Agudos J.A. Fernández: 4808-2606/2646/2604/2121;

Centro de toxicología: 011-4808-2655

CONSERVACIÓN:

Conservar entre 8 °C y 30 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

PRESENTACIONES:

Comprimidos recubiertos:

Envases con 10, 15, 20, 50, 150, 500, 1.000 y 1.005 comprimidos recubiertos, siendo las últimas 4 presentaciones para uso hospitalario exclusivo.

Inyectable:

Envases con 1, 6 y 100 ampollas, siendo el último para uso hospitalario exclusivo.

Solución oral:

1 y 32 frascos de 20 ml, siendo el último de uso hospitalario exclusivo.

Supositorios:

Envases con 6 supositorios.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 42.898

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Inyectables, comprimidos recubiertos, supositorios:

Elaborado en Planta Quilmes.

Solución Oral:

Elaborado en Planta Córdoba.

Fecha de última revisión: 12/1993



KLONAL

LABORATORIO

COMPROMETIDOS CON TU SALUD

KLONAL S.R.L.

Planta Quilmes: Lamadrid 802 - Quilmes - C.P. (B1878CZV)

Provincia de Bs. As., Argentina. Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

Planta Córdoba: Av. Bernardo O'Higgins 4034 - Barrio San Carlos, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.

TINTA CYAN NO VA IMPRESA

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: ../../....	Fecha:../../....	Fecha:../../....
		Resolución

Código/Versión	K.029/M
Color de Impresión:	Negro
Medida:	135 x 240 mm
Formato:	12