

LUBRICTIN
CONDROITÍN SULFATO A 3 %

Solución oftálmica estéril
Venta libre

Industria Argentina

K.171/K

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:
CONDROITÍN SULFATO A.....3 g
Excipientes: Sorbato de potasio, cloruro de sodio, hialuronato de sodio, agua purificada, c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Lubricante ocular.

DESCRIPCIÓN:

El condroitín sulfato A es un mucopolisacárido (glicosaminoglicano) de un peso molecular aproximado a 50.000. Este tiene como unidad monomérica la N-acetilcondrosina, con un grupo sulfato por cada unidad de disacárido. El origen de la materia prima es biológico de procedencia bovina.

INDICACIONES:

Alivio temporario de las irritaciones del ojo y síntomas asociados (ardor y sequedad ocular), humedeciendo y disminuyendo la sensación de sequedad ocular.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES:

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Actúa como lubricante oftalmológico.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Posología habitual: Colocar en el fondo del saco conjuntival 1 o 2 gotas de LUBRICTIN de 4 a 5 veces al día, prolongando el tratamiento según criterio médico.

Embarazo: Categoría C.

Niños: Puede ser administrado en niños bajo las pautas establecidas en la posología habitual.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al condroitín sulfato A o a cualquier otro componente de la fórmula.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Se debe suspender su uso frente a una reacción de hipersensibilidad, dolor ocular, cambios en la visión o si el enrojecimiento o la irritación del/de los ojo/s empeora o dura más de 72 horas.

En caso de queratitis de origen bacteriano, su uso debe asociarse con un antibiótico.

En ojo seco puede administrarse como lágrima artificial.

Para preservar la esterilidad del producto se recomienda evitar el contacto directo entre la punta del gotero y los ojos o cualquier otra superficie al aplicar.

Para uso tópico solamente - No inyectar

TINTA CYAN NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Pantone negro
Medida:	120 x 135 mm
Formato:	17

No utilizar este producto si el precinto de seguridad fue violado.

REACCIONES ADVERSAS:

Eventualmente puede producir enrojecimiento de la conjuntiva y leve escozor en pacientes sensibles a cualquiera de sus componentes.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital Nacional Alejandro Posadas:

Centro de toxicología: 011-4658-7777/011-4654-6648

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 0800-444-8694

Centro de toxicología: 011-4962-6666

Hospital General de Agudos J.A. Fernández: 4808-2606/2646/2604/2121;

Centro de toxicología: 011-4808-2655

PRESENTACIONES:

Frasco gotero con 10 ml. Envases conteniendo 1 y 40 frascos gotero, siendo estos últimos para uso hospitalario exclusivo.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente, entre 8 °C y 30 °C, al abrigo de la luz. Usar dentro de las 4 semanas de abierto.

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO,
DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 50.784.

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Elaborado en: Planta Quilmes

Fecha de última revisión: 10/2009



COMPROMETIDOS CON TU SALUD

KLONAL S.R.L.

Planta Quilmes: Lamadrid 802 - Quilmes - C.P. (B1878CZV)

Provincia de Bs. As., Argentina. Tel. Fax: +54 11 4251-5954/5955

Planta Córdoba: Av. Bernardo O'Higgins 4.034 - Barrio San Carlos,

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.

Farmacovigilancia: farmacovigilancia@klonal.com.ar

TINTA CYAN NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Pantone negro
Medida:	120 x 135 mm
Formato:	17