




Mecanismo de Acción y Grupo Farmacológico

ACCIÓN: Inhibe de forma irreversible la enzima $H^+/K^+-ATPase$ (bomba de protones) ubicada en las células parietales del estómago.

EFFECTO: Bloquea la producción de ácido gástrico, tanto la basal como la estimulada por factores como alimentos, gastrina o histamina.

CLASE: Pertenece al grupo de los inhibidores de la bomba de protones (agentes antisecretores gástricos).

Indicaciones Clínicas Principales

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)



Tratamiento de rescate o prevención de nuevo sangrado por úlcera péptica.

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE) SEVERA



Daño grave por ácido patológica.

SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON



Estados de hipersecreción ácida patológica.

PREVENCIÓN PREQUIRÚRGICA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO



En pacientes prequirúrgicos de alto riesgo o críticos, para la profilaxis de la aspiración ácida.

ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL HOSPITALIZADOS



Úlcera gástrica o duodenal en pacientes hospitalizados.