

KLOMEPRAX

IFA: OMEPRAZOL

CONCENTRACIONES AUTORIZADAS: 10 mg /20 mg

FORMAS FARMACÉUTICAS: CÁPSULAS

VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE?

Fórmula/ Principio activo: **OMEPRAZOL 10 mg**

Ingredientes inactivos: Manitol polvo, sucrosa grado farmacéutico, azúcar grado especial 30/40, fosfato hidrógeno disódico, carbonato de calcio, lauril sulfato de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, copolímero tipo C de ácido metacrílico, dietilftalato, dióxido de titanio, talco c.s.

Fórmula/ Principio activo: **OMEPRAZOL 20 mg**

Ingredientes inactivos: Manitol polvo, sucrosa grado farmacéutico, azúcar grado especial 30/40, fosfato hidrógeno disódico, carbonato de calcio, lauril sulfato de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, copolímero tipo C de ácido metacrílico, dietilftalato, dióxido de titanio, talco c.s.

ACCIÓN:

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA OMEPRAZOL?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR OMEPRAZOL?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
No administrar en menores de 18 años de edad.
No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida;
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones;
- tiene diarrea prolongada o que no mejora;
- acidez desde hace más de tres meses;
- acidez con mareos o transpiración;
- dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello;
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- pérdida de peso inexplicable;
- dolor de estómago, náuseas o vómitos;
- trastornos renales y/o hepático.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolen-

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: ../../..	Fecha: ../../..	Fecha: ../../..
		Resolución

TINTA CYAN NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Negro
Medida:	240 mm x 135 mm
Formato:	12

cia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.
Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)
- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como nelfinavir, atazanavir (medicamentos para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el omeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.
Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.
No rompa ni mastique las cápsulas.
No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.
No tome por más de 14 días sin consulta médica.
Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.
No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.
El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON ALGUNO DE LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA DEL PAÍS. ENTRE OTROS:

Hospital Nacional Alejandro Posadas:
Centro de toxicología: 011-4658-7777/011-4654-6648
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 0800-444-8694
Centro de toxicología: 011-4962-6666
Hospital General de Agudos J.A. Fernández: 4808-2606/2646/2604/2121;
Centro de toxicología: 011-4808-2655
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

PRESENTACIONES:
14, 98 y 1400 cápsulas, siendo las dos últimas de uso hospitalario exclusivo.

CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura entre 8°C y 30°C, en lugar seco y al abrigo de la luz, en su envase original.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese a los siguientes teléfonos:
ANMAT Responde: 0800-333-1234
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 48.514
Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico
Fecha de última revisión: 11/2024
Elaborado en: Planta Quilmes



KLONAL
LABORATORIO
COMPROMETIDOS CON TU SALUD

KLONAL S.R.L.
Planta Quilmes: Lamadrid 802 - Quilmes - C.P. (B1878CZV)
Provincia de Bs. As., Argentina. Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955
Planta Córdoba: Av. Bernardo O'Higgins 4.034 - Barrio San Carlos,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:/..../....	Fecha:/..../....	Fecha:/..../....
		Resolución

TINTA CYAN NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Negro
Medida:	240 mm x 135 mm
Formato:	12