

# KLONDROXIL

## CEFADROXIL

Polvo para preparar Suspensión Oral - Comprimidos Recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria Argentina

K-90/1

### **Comprimidos:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Cefadroxil (como cefadroxil monohidrato).....500mg

Excipientes: Lactosa monohidrato - celulosa polvo, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, estearato de magnesio, opadry II, laca aluminica azul brillante, agua purificada, c.s.

### **Suspensión Pediátrica 125 mg / 5 ml:**

Cada frasco de polvo para preparar suspensión oral contiene:

Cefadroxil (como cefadroxil monohidrato).....125mg/ 5ml

Excipientes: Ácido cítrico anhidro, citrato de sodio, metilparabeno soluble, hidroxipropilactilcelulosa 1828, alginato de sodio, aerosil 200, esencia en polvo de frutilla, colorante punzó 4R, azúcar, c.s.

### **Suspensión Pediátrica 250 mg / 5 ml:**

Cada frasco de polvo para preparar suspensión oral contiene:

Cefadroxil (como cefadroxil monohidrato).....250mg/ 5ml

Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, benzoato de sodio, ciclamato de sodio, sacarina sódica, citrato de sodio anhidro, carboximetilcelulosa, esencia de naranja en polvo, ácido cítrico anhidro, c.s.

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

Antibiótico cefalosporínico semisintético de amplio espectro y alto potencial terapéutico por vía oral.

### **INDICACIONES:**

Cefadroxil se usa en el tratamiento de faringitis y amigdalitis estreptocócica del grupo A-Betahemolítico; en el tratamiento de infecciones de la piel causadas por estafilococos o estreptococos susceptibles e infecciones del tracto urinario causadas por organismos susceptibles (*E. Coli*, *Proteus Mirabilis*, *Klebsiella*).

### **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:**

- Adultos: Faringitis estreptocócica del Grupo A - Betahemolítico (incluyendo amigdalitis): 500 mg (base anhidra) cada 12 horas, o 1 g una vez al día por 10 días.

- Infecciones de la piel y tejidos blandos: 500 mg (base anhidra) cada 12 horas o 1 g una vez al día.

- Infecciones del tracto urinario: 500 mg o 1 g (base anhidra) cada 12 horas o 1 a 2 g una vez al día.

### **NOTA:**

Después de una dosis inicial de 1 g (base anhidra) los adultos con función renal disminuida pueden requerir una reducción de la dosis.

| Clearance de Creatinina<br>(ml/min/1.73 m <sup>2</sup> ) | Dosis<br>(base anhidra)    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| >50                                                      | Ver dosis usual en adultos |
| 25-50                                                    | 500 mg cada 12 horas       |
| 0-25                                                     | 500 mg cada 24 horas       |

Dosis máxima: Hasta 6 g diarios (base anhidra).

Niños: Faringitis estreptocócica del grupo A-Betahemolítico (incluyendo amigdalitis) 25 mg por kg de peso cada 12 horas o 30 mg por kg de peso una vez por día durante 10 días.

Infecciones de la piel y tejidos blandos o infecciones del tracto urinario: 15 mg por kg de peso cada 12 horas.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Debe continuarse con la medicación hasta terminar el tratamiento.

Debe utilizarse con precaución en pacientes intolerantes a otras cefalosporinas, Cefamicina, penicilinas y derivados, pues también pueden serlo al Cefadroxil.

Puede producir llagas en la boca o en la lengua.

### **INTERACCIÓN CON OTRAS DROGAS:**

Aminoglucósidos, Bumetanida, Carmustina, Ácido Etacrínico, Furosemda, anticoagulantes cumarínicos o derivados de Indandiona, heparina, analgésicos antiinflamatorios no esteroides, especialmente Aspirina, altas dosis de Diflunisal, otros salicilatos, otros agentes inhibidores de la agregación de plaquetas, Probenecid.

### **EFFECTOS ADVERSOS:**

Incidencias raras: calambres, dolor y distensión abdominal o estomacal severos, diarreas acuosas y severas, que pueden ser sanguinolentas; fiebre, sed incrementada; náuseas o vómitos; decaimiento o debilidad inusual; pérdida inusual de peso (colitis pseudomembranosa).

Incidencias más frecuentes: diarrea suave; salpullido, picazón, enrojecimiento o hinchazón en la piel (hipersensibilidad); llagas en la lengua o en la boca (crecimiento exuberante de hongos); calambres o trastornos estomacales suaves.

Incidencias menos frecuentes o raras: picazón en las zonas rectal o genital (desarrollo de hongos).

### **PREPARACIÓN:**

Agitar el frasco para desprender el polvo adherido a las paredes. Agregar agua potable hasta el nivel que indica la flecha del frasco. Agitar vigorosamente para facilitar la suspensión del polvo. Completar con agua potable nuevamente hasta hasta el nivel que indica la flecha del frasco. Agitar hasta obtener una suspensión homogénea.

### **CONSERVACIÓN:**

Comprimidos recubiertos y suspensión previa a su reconstitución, a temperatura menor a 30 °C, al abrigo de la luz.

Suspensión después de preparada, conservar durante 15 días a temperatura entre 2 °C y 8 °C.

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>De:</b> IMPREQUIL SRL                    | <b>Fecha:</b> 01/06/2017               |
| <b>Para:</b> KLONAL LAB. - Gerencia Técnica | <b>Medida:</b> 135 x 200 mm            |
| <b>Asunto:</b> Muestra para corrección      | <b>Color de impresión:</b> Pantone 341 |

**PRESENTACIONES:**

Envases con 8, 16 y 1.000 comprimidos recubiertos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Envases con un frasco de suspensión pediátrica 125 mg x 60 ó 90 ml. y 96 frascos x 60 ó 90 ml; siendo estos últimos para uso hospitalario exclusivo.

Envases con un frasco de suspensión pediátrica 250 mg x 60 ó 90 ml y 96 frascos x 60 ó 90 ml; siendo estos últimos para uso hospitalario exclusivo.

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

En caso de sobredosis accidental, de inmediato se debe contactar al médico o concurrir al hospital más cercano.

Hospital Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777

Hospital de Pediatría R. Gutierrez: (011) 4962-6666/2247

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

**«ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA, Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA»**

**MATENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.891

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 07/1992

---

Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)  
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

